

Oznakowanie opakowania bezpośredniego – butelka szklana z zakrętką z kropłomierzem z polietylenu

Krople walerianowe Aflofarm

Tinctura Valerianae FP

Krople doustne, 1 ml/1 ml

35 g

Skład na 100 g:

Nalewka z korzeni kozłka przygotowana zgodnie z recepturą FP - 100,0 g;
rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol.

Produkt zawiera 64,0 – 68,0% (v/v) etanolu.

Działanie: Uspokajające.

Wskazania do stosowania: Przejściowe stany łagodnego napięcia nerwowego oraz przejściowe trudności z zasypianiem.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na korzeń kozłka lekarskiego (waleriane).

Interakcje: Nie zaleca się stosowania jednocześnie z innymi lekami uspokajającymi.

Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach stosowania należy skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera 64,0 – 68,0% (v/v) etanolu (alkoholu), tzn. średnio 500 mg czystego etanolu, co jest równoważne ok. 19 ml piwa, 7,9 ml wina na dawkę 45 kropli (1,5 ml).

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Sposób stosowania i droga podania:

Podanie doustne.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: w łagodnych stanach napięcia nerwowego: 45 kropli (1,5 ml płynu) w ¼ szklanki wody 3 razy dziennie.

W przejściowych trudnościach z zasypianiem: 60 kropli (2 ml płynu) wieczorem, 30-60 minut przed udaniem się na spoczynek, z wcześniejszą dawką 45 kropli podczas kolacji, jeśli konieczne.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem na etykiecie lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie: W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana mogą wystąpić łagodne objawy (zmęczenie, skurcze brzucha, zawroty głowy, rozszerzenie źrenic, uczucie ucisku w klatce piersiowej, drżenie rąk), które mijają w ciągu 24 godzin.

Jeśli objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku pominięcia dawki leku kolejną należy zastosować jak najszybciej.

Działania niepożądane: Sporadyczne przypadki nietolerancji waleriany (dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. nudności, skurcze brzucha). Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować po upływie terminu ważności, zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Tel. (42) 22-53-100

Numer serii:

Pozwolenie nr IL-0025/LN

Kod EAN: 5909990018543

Informacja podana systemem Braille'a: Krople walerianowe Aflofarm